

Zalából jön a moly

Szombathely (pg) – Tavaly a puszpángiloncára (*Cydalima perspectalis*), Zalaegerszegen tarrá rágta a növényeket. Az idén már Vas megyében is megjelentek, a díszkertekben akár egy nap alatt képesek lerágni az összes levelet a tömegével kikelő hernyók.

A rovar kelet-Ázsiából származik, 2006-ban jelent meg Németországban – tudtuk meg *Both Gyulától*, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnökétől. A lepkék négy centiméter szárnyfesztávolságúak, nappal a levelek fonákján találhatóak, éjszaka aktívak, ezért nehezen észlelhetők. A hernyók kifejlődve elérik az 5 centiméter nagyságot, színük zöld, fehér és fekete sávokkal. A petékből kikelő hernyók pókhálószerű szövedéket képeznek, ez alatt rágják a leveleket. Belülről kifelé haladnak, ezért sokszor már későn vesszük észre. Nálunk feltehetően három nemzedéke alakul ki, így évente többször is megjelenhet a kertekben, temetőekben. A védekezésnél fontos, hogy hosszú hatású nö-

vényvédő szereket alkalmazunk. Ilyenek a kitinszintézisgátlók (pl. diflubenzuron), valamint a *Bacillus thuringiensis* tartalmazó készítmények. Fontos még, hogy használjunk tapadó szert, és nagy nyomáson juttassuk a permetlevet a bokrok közébe.



A puszpángilonca kifejlett alakja