

2/2022.

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT 2022. május 8.

A fejlődési (fenológiai) stádium: **3-5 kislevelű állapot.**

Az elmúlt napok (május 1 - május 7-ig) átlaghőmérséklete meghaladta a 10 C⁰-t.

(A mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 15,37 C⁰, Kőszeg térségében 14,04 C⁰, Vaskeresztes térségében 14,17 C⁰. A mért csapadék Celldömölk térségében 5,8 mm, Kőszeg térségében 14,2 mm, Vaskeresztes térségében 12,4 mm volt.)

Peronoszpóra (Plasmopara viticola) elsődleges (primer) fertőzés lehetősége várhatóan létrejön amennyiben a levelek elérték 3-4 cm nagyságot és amennyiben a következő napokban sem esik az éjszakai hőmérséklet 10 C⁰ alá. A csapadék meghaladja a 10 mm-t.

Jelen hőmérsékleti viszonyok között a lappangási idő: 12-18 nap.

Lisztharmat (Uncinula necator) primer fertőzést a vizsgált ültetvényekben még nem találtam.

Szürkerothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége alacsony, a fűrtkezdemény még nincs fogékony stádiumban.

Tarka szőlómoly (Lobesia botrana) imágó rajzása intenzív. Ellene való védekezés még indokolatlan.

Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis). Sajnos több helyen található a kártevővel fertőzött ültetvény. Felszaporodása folyamatosan várható. Minden termelő pontosan ellenőrizheti ültetvényét, hogy szembesül-e ilyen problémával vagy sem. A Szőlőgubacsatka jelenlétét mutatja a kezdetben bordóba hajló sötétpiros elszíneződés a jellegzetes, többnyire kerek a lomblevél színe felé domborodó torzulások formájában.

Ékköves faaraszoló (Peribatodes rhomboidaria) károsítása már csak a nagyon elmaradott tőkénél fordulhat elő.

Folyamatos tüzetes ültetvény vizsgálat szükséges.

Javaslat: megelőző védelem szükséges.

A védekezést lehetőleg az esős periódust követően 12-13 napon belül fejezzük be. Figyelembe véve az esetleges hőmérséklet emelkedést.

Elsősorban kontakt készítmények alkalmazását javaslom, mint a Lisztharmat, mint a Peronoszpóra esetében. Erős előző évi Lisztharmat fertőzés esetében elsősorban a Karathane Star alkalmazását javaslom. Atka (szőlőlevélatka, gubacsatka), vagy Ékköves faaraszoló ellen csak jelenléte esetén indokolt a beavatkozás az 1/2022. védekezési javaslat alapján.

Lisztharmat ellen-	Thiovit Jet	500 g /1000 m ² /100liter (III. kategória), vagy
	Karathane Star	60 ml/1000 m ² /100 liter (II./III. kategória).
Peronoszpóra ellen-	Delan 700 WG	50 g/1000 m ² /100 liter (II. kategória), vagy
Peronoszpóra, szőlőorbánc ellen-	Polyram DF	250 g/1000 m ² /100 liter(II./III. kategória).

Thiovit Jet - helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol Special, Necator 80 WG.

Delan 700 WG - helyettesítő készítmény: Delan Pro.

A megadott dózisek 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége.

Vaskeresztes, 2022. május 8.

Hatos István
szaktanácsadó

Melléklet: fénykép (fenológiai állapot) ,
fénykép (Szőlő gubacsatka fertőzés első tünetei).