

3/2022.

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT 2022. május 18.

A fejlődési (fenológiai) stádium: **5-8 leveles állapot.**

Az elmúlt időszak (május 8 - május 18-ig) átlaghőmérséklete meghaladta a 10 C⁰-t.

(A mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 18,44 C⁰, Kőszeg térségében 17,84 C⁰, Vaskeresztes térségében 17,96 C⁰. A mért csapadék Celldömölk térségében 3,4 mm, Kőszeg térségében 32,4 mm, Vaskeresztes térségében 4,2 mm volt.)

Peronoszpóra (Plasmopara viticola) elsődleges fertőzés lehetősége az elmúlt napokban (Kőszeg és Vaskeresztes térségében) kialakult. A kiemelt két térségben naponta a jelentős párakicsapódás következtében több órás cseppfolyós vízborítottság alakult ki, elősegítve újabb fertőzés lehetőségét.

Az előzőekben feltüntetett hőmérsékleti viszonyok között a lappangási idő: 5-7 nap.

Celldömölk térségében a rendelkezésre álló adatok alapján a primér fertőzés lehetősége még nem alakult ki.

Lisztharmat (Uncinula necator) primér fertőzés a vizsgált ültetvényekben még nem találtam.

Szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége emelkedett, azonban a firtkezdemény még nincs fogékony stádiumban, Jégkár, mechanikai sérülés esetén szükséges a fertőzést megelőző védekezést elvégezni.

Tarka szőlómoly (Lobesia botrana) imágó rajzása folytatódik. Védekezés még nem indokolt.

Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis) felszaporodás a következőkben is várható.

Folyamatos tüzetes ültetvény szemle a továbbiakban is nagyon fontos.

Javaslat: megelőző védelem különösen azon ültetvényben fontos, ahol még nem történt

beavatkozás. Ahol már volt védekezés ott 10-11 napos permetezési fordulót javasolok.

Továbbra is a kontakt készítmények alkalmazását javaslom, mint a Lisztharmat, mint a Peronoszpóra esetében. Erős előző évi Lisztharmat fertőzés esetében, amennyiben az előzőekben nem került alkalmazásra, elsősorban a Karathane Star készítményt tartom hatékonynak. Atka (szőlőlevélatka, gubacsatka) ellen csak jelenléte esetén indokolt a beavatkozás.

Lisztharmat ellen-	Thiovit Jet	500 g /1000 m ² /100liter (III. kategória), vagy
	Karathane Star	60 ml/1000 m ² /100 liter (II./III. kategória).
Peronoszpóra ellen-	Delan 700 WG	50 g/1000 m ² /100 liter (II. kategória), vagy
Peronoszpóra, szőlőorbánc ellen-	Polyram DF	250 g/1000 m ² /100 liter(II./III. kategória).
Peronoszpóra, szürkepenész ellen-	Folpan 80 WDG	120 g/1000m ² /100 liter(I. kategória), vagy
Lisztharmat, szürkepenész ellen-	Folicur Solo	40 g/1000m ² /100 liter(II. kategória).

Thiovit Jet - helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol Special, Necator 80 WG, SolfoMet, S 80 WG.

Delan 700 WG - helyettesítő készítmény: Delan Pro.

Folpan 80 WDG - helyettesítő készítmény: Follow 80 WG.

Folicur Solo - helyettesítő készítmény: Tebusha 25 EW.

A megadott dózisek 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége.

Vaskeresztes, 2022. május 18.

Hatos István
szaktanácsadó

Melléklet: fényképek (fenológiai állapot) ,
meteorológia (Vaskeresztes, Bozsok, Celldömölk),