

4/2022.

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT 2022. május 24.

A fejlődési (fenológiai) stádium: **fürtmegnyúlás kezdete, 20-50 cm-es hajtás állapot.**

Az elmúlt időszak (május 19 - május 23-ig) átlaghőmérséklete meghaladta a 10 C⁰-t, azonban előfordult 10 C⁰ alatti éjszakai lehülés is.

(A mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 18,68 C⁰, Kőszeg térségében 18,45 C⁰, Vaskeresztes térségében 18,17 C⁰. A mért csapadék Celldömölk térségében 3,0 mm, Kőszeg térségében 6,4 mm, Vaskeresztes térségében 2,2 mm volt. Az átlagos relatív páratartalom 65,0 % körül alakult.)

Peronoszpóra (Plasmopara viticola) új fertőzés lehetősége létrejött. Jelen hőmérsékleti viszonyok esetén az inkubációs idő 5-6 nap, azonban az éjszakai lehülések nagyban hátráltatják a kórokozó fejlődését, fertőző képességét.

Lisztharmat (Uncinula necator) primér fertőzés megakadályozására nagyon fontos a virágzás előtti célzott megelőző védekezés.

Szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége alacsony, a fürtkezdemény a fürtmegnyúlással lassan fogékony állapotba kerül.

Tarka szőlómoly (Lobesia botrana) imágó rajzása lezárult. A lárvakelés (elsősorban a melegebb fekvésű területeken) elindulása várható. Ellene való védekezés javasolt, különösen azokon a területeken ahol az előző években előfordult a károsítása.

Szőlógubacsatka (Eriophyes vitis) felszaporodás a következőkben is várható.

Folyamatos tüzetes ültetvény szemle a továbbiakban is nagyon fontos.

Javaslat: megelőző védelem különösen azon ültetvényben fontos, ahol még nem történt beavatkozás.

Peronoszpóra ellen elegendőnek tartom a kontakt készítményeket, a lisztharmat megelőzésére a kontakt készítményt javasolt felszívódó permetezőszerrel kiegészíteni.

Atka (szőlőlevélatka, gubacsatka) ellen csak jelenléte esetén indokolt a beavatkozás.

Lisztharmat ellen-	Thiovit Jet	500 g /1000 m ² /100liter (III. kategória), vagy
	Karathane Star	60 ml/1000 m ² /100 liter (II./III. kategória).
+ felszívódó készítmény	Pl. Topas 100 EC	30 ml/ 1000 m ² /100liter (III. kategória).

Peronoszpóra ellen-	Delan 700 WG	50 g/1000 m ² /100 liter (II. kategória), vagy
Peronoszpóra, szürkepenész ellen-	Folpan 80 WDG	120 g/1000m ² /100 liter(I. kategória).

A kombinációk mindegyikéhez javasolt a

Szőlómoly elleni készítmény- Coragen 20 SC 17 ml/100 liter (II-III. kategória).

Coragen 20 SC helyettesítő készítmény- pl.Dipel DF EC, Avaunt 150 EC, Steward 30 DF, Insegar 25 WG.

Delan 700 WG - helyettesítő készítmény: pl.Delan Pro. Polyram DF.

Folpan 80 WDG - helyettesítő készítmény: pl.Follow 80 WG.

Thiovit Jet - helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol Special, Necator 80 WG, SolfoMet, S 80 WG.

Topas 100 EC helyettesítő készítmény- Systhane 20 EW, Dynali, Luna privilege.

(szürkepenész ellen is hatékony)- Topsin-M 70, Folicur solo, Luna experience.

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége.

Vaskeresztes, 2022. május 24.

Hatos István